

## Wunddokumentation im [www.wund.info](http://www.wund.info) Portal

www.wund.info ist ein Service der ©PHADIMED Pharma-Medica GmbH & Co. Direktvertriebs KG

Industriestr. 40, 44628 Herne, Tel.: 02323/1786-0 Fax: 02323/1786-40

Email: [phadimed@phadimed.de](mailto:phadimed@phadimed.de)

Geschäftsführung:

Dr. med. U. Matthes, Dorothea Gerling

Handelsregister: HRA 778 AG Herne

UST-ID: DE162256226All rights reserved

### **Abheilung eines seit 30 Jahren bestehenden Ulcus cruris linker Unterschenkel dokumentiert von Sr. Sigrid Dautzenberg, Krankenschwester und Wundmentorin des Sanitätshauses Lettermann, Viersen**

#### **Anamnese:**

63 jährige Patientin mit Ulcus cruris venosum links, 1964 nach einem Motorradunfall drittgradig offene Unterschenkel-Fraktur links. Seit diesem Zeitpunkt mit 1-2-jähriger Unterbrechung immer offenes Ulcus linker Unterschenkel, trotz ambulant chirurgischer Versorgung.  
Stationärer Aufenthalt 23. März bis 6. Mai 1998: Ulcusexcision, Fasziotomie, Perforansligatur, Postoperativ sekundäre Wundheilung. Wundtherapie: trockene Verbände bzw. Salbenverbände.  
Übernahme zur ambulanten Wundversorgung durch das Sanitätshaus Lettermann am 21. Mai 2002.

#### **Therapie:**

Wundreinigung mit Prontosan Wundspüllösung, die auf 30 Grad erwärmt wurde. Bei jeder Wundbehandlung wurde unter Analgesie ein Debridement mit scharfem Löffel durchgeführt. Systemische Antibiose.

#### **Befund:**

Übelriechendes mit Nekrosen und Fibrin belegtes Ulcus linker Unterschenkel 25 cm x 10 cm. Durchführung eines Abstriches zur Keimbestimmung.

#### **Verbandregime:**

Einsatz von Acticoat® zur Keimreduzierung, Wundabdeckung mit Allevyn® Adhesive. Kompressionstherapie anfänglich mit Kompressionsbinden anschließend mit Ulcusstrumpf durchgeführt. Weitergehende Therapie ab 14. November mit Acticoat® und Cutinova® Foam (jetzt Allevyn® Compression). Kompression mit Kompressionsstrumpf Klasse 3.



Ausgangsbefund 23. Mai 2002:



8. Juli 2002 bis 12. Dezember 2002: Deutliche Reduktion der Wundfläche.



Umgebungshaut wird mit OpSite® Spray vor Mazerationen geschützt.



6. Januar 2003: Weiter deutliche Granulation, Epithelisierung und Wundverkleinerung. Die nun teilweise sehr trockene Umgebungshaut wird mit Eucerin und Harnstoffsalbe geschmeidig gehalten.

**Zusammenfassung:**

Durch die konsequente Behandlung mit der modernen, feuchten Wundtherapie und einer adäquaten Kompressionstherapie, konnte das seit 30 Jahren bestehende Ulcus cruris zur Abheilung gebracht werden.

® Handelsmarken von Smith+Nephew



06. März 2003:  
Restdefekt von ca. 1 cm Größe

Die Arbeit entstand mit freundlicher Unterstützung von

